

Vacunación Escolar 2025

Departamento de Inmunizaciones

Ministerio de Salud

12 de junio 2025



GES | **20**
años
GARANTÍAS EXPLÍCITAS
EN SALUD

VACUNACIÓN ESCOLAR 2025

Proteger a la población en etapa escolar que habita en Chile, según calendario de vacunación vigente.

VACUNA	POBLACIÓN OBJETIVO
dTpa (acelular)	Escolares que cursan 1º y 8º año básico en establecimientos educacionales públicos y privados.
VPH	Escolares que cursan 4º año básico en establecimientos educacionales públicos y privados.

VACUNACIÓN ESCOLAR 2025

CALENDARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES 2025

VACUNAS PROGRAMÁTICAS

	POBLACIÓN INFANTIL										ESCOLAR			POBLACIÓN ADULTA		
	RECIÉN NACIDO	2 MESES	3 MESES	4 MESES	5 MESES	6 MESES	12 MESES	18 MESES	24 MESES	36 MESES	1º BÁSICO	4º BÁSICO	8º BÁSICO	GESTANTES	≥60 AÑOS	≥65 AÑOS
BCG Enfermedades invasoras por <i>M. tuberculosis</i>	Única dosis															
HEPATITIS B	Única dosis															
HEXAVALENTE Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva, Enfermedades Invasoras por <i>H. influenzae</i> tipo b (Hib), Poliomielitis		1ª dosis	2ª dosis	3ª dosis			Refuerzo									
NEUMOCÓCICA CONJUGADA 13 VALENTE Enfermedades invasoras por <i>S. pneumoniae</i>		1ª dosis	2ª dosis	3ª dosis (sólo pre-maturos)			Refuerzo									
MENINGOCÓCICA RECOMBINANTE SEROGRUPO B Enfermedades invasoras por <i>N. meningitidis</i> (serogrupo B)		1ª dosis	2ª dosis				Refuerzo									
SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS (SRP)							1ª dosis			2ª dosis						
MENINGOCÓCICA CONJUGADA TETRAVALENTE Enfermedades invasoras por <i>N. meningitidis</i> (A, C, W-135, Y)							Única dosis									
HEPATITIS A							Única dosis									
VARICELA							1ª dosis			2ª dosis						
FIEBRE AMARILLA							Única dosis (sólo en Zona Huai)									
DIFTERIA, TÉTANOS Y TOS CONVULSIVA (ACELULAR)											1ª dosis	2ª dosis		Desde la semana 28 de gestación		
VIRUS PAPILOMA HUMANO (VPH)												Única dosis				
NEUMOCÓCICA POLISACÁRIDA 23 VALENTE Enfermedades invasoras por <i>S. pneumoniae</i>															Única dosis	

CAMPAÑAS DE INMUNIZACIÓN

COVID-19																
INFLUENZA																
VIRUS RESPIRATORIO SINICIAL Anticuerpo Monoclonal NACIDOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024																
MPOX																



DIFTERIA, TÉTANOS Y TOS CONVULSIVA (ACELULAR)

VIRUS PAPILOMA HUMANO (VPH)

ESCOLAR

1º BÁSICO	4º BÁSICO	8º BÁSICO
1ª dosis		2ª dosis
	Única dosis	

MARCO REGULATORIO


Norma General Técnica sobre Procedimientos Operativos Estandarizados, Resolución exenta N°973 del 14.10.2010. Asegurar la calidad en la ejecución y administración de las vacunas

Guía de Vacunación Segura- Sistema de Notificación, Evaluación e Investigación de ESAVI y EPRO. Resolución Exenta N°670 del 08.10.2013

Decreto N°50 de 2021 de Vacunación obligatoria

Decreto N°68 de 2021: Modifica edad de administración vacuna SRP

Decreto N°53 de 2024: Modifica grupo objetivo para administración vacuna VPH



- Norma POE: <http://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2014/03/Res.Exenta-N%C2%BA-973-Norma-Gral-procedimientos-POE-Completa.pdf>
- Guía de vacunación segura ESAVI-EPRO: <http://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/06/norma-N%C2%B0670-Gu%C3%ADa-Vacunacion-Segura-8-oct-2013.pdf>
- Decreto Exento N°50: <https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/10/Decreto-Exento-N%C2%B0-50-09-21-Dispone-Vacunaci%C3%B3n-Obligatoria-enfermedades-inmunoprevenibles.pdf>
- Modificación Decreto Exento N°50: <https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/12/Decreto-Exento-N%C2%B0-68-30-12-2021.pdf>
- Modificación Decreto Exento N°50: <https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2024/10/Decreto-exento-53-VPH.pdf>

MARCO REGULATORIO



Lineamientos Técnico Operativos para la Vacunación Escolar Actualización 2025

Ord. N°3575/2023 “Recomendaciones para la puesta al día de calendarios de vacunación en Chile”

Ord. N°2029/2024 “Validación de registros de vacunas para la continuidad de esquemas de vacunación en Chile”

- <https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2023/10/3575-ord-recomendaciones-puesta-al-dia-de-calendario-de-vacunacion-en-Chile.pdf>
- <https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2024/10/2029-ORD-VALIDACION-DE-REGISTRO-CONTINUIDAD-DE-ESQUEMA-DE-VACUNACION.pdf>

MARCO REGULATORIO

The screenshot shows the website 'vacunas.minsa.cl' with a dark blue header. The main navigation bar includes 'Ministerio de Salud', 'Conózcenos', 'Información a la comunidad', 'Información a equipos de salud' (highlighted), and 'Noticias'. A search icon is on the right. The 'Marco regulatorio' dropdown menu is open, listing: 'Capacitación', 'Calendarios de Vacunación', 'Vacunación Segura', 'Cadena de Frio', 'Sistema de inventario', 'Registro Nacional de Inmunizaciones', 'Coberturas preliminares', 'CAVEI', 'Logística y distribución', 'Plan Nacional de Vacunación contra SARS-CoV-2', 'Puesta al día', 'Vacunación Especial', and 'Vacunación Escolar'. The main content area features a large banner for 'Vacunación escolar' with a description and a 'Ver más' button. Below the banner, a section titled 'Coberturas de campañas de vacunación' displays three statistics: '73.05%' for 'Cobertura Influenza 2025', '1.241.296' for 'Vacunados COVID-19 2025', and '86.7%' for 'Cobertura VBS - Lactantes 2025'. The background of the banner shows children with backpacks.

Vacunación escolar


La estrategia de vacunación escolar se inicia durante el segundo semestre de cada año. Es importante conocer los aspectos técnico-operativos de esta vacunación. Las vacunas a administrar corresponden contra la difteria, tétanos, tos convulsiva (dTpa) y Virus Papiloma Humano (VPH).

[Ver más](#)

Coberturas de campañas de vacunación

Cobertura	Valor
Cobertura Influenza 2025	73.05%
Vacunados COVID-19 2025	1.241.296
Cobertura VBS - Lactantes 2025	86.7%

HISTORIA DE LA VACUNACIÓN ESCOLAR EN CHILE



ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ESCOLAR

Se desarrolla en:

- ✓ 2° semestre de cada año.
- ✓ Establecimientos de educación públicos y privados del país.



QUIEN DESARROLLA ESTA ESTRATEGIA:

1

Equipos de Atención Primaria de Salud (APS) de los CESFAM, son los que realizan la vacunación extramural en los establecimientos de educación del país.

2

Además, los vacunatorios públicos y privados en convenio, realizan esta vacunación escolar a la población objetivo que acuda espontáneamente durante todo el año.

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ESCOLAR

Asegurar la vacunación en escolares y adolescentes que:

- 1 No asistan a establecimientos educacionales en forma regular o que rindan exámenes libres.
- 2 Se encuentren en **instituciones públicas o privadas** como aulas hospitalarias, residencias (SENAME, Mejor Niñez, entre otros).
- 3 **Asistan a escuelas especiales** de enseñanza básica. Esta vacunación se debe realizar según el curso correspondiente definido en el Decreto N° 83/2015 (MINEDUC), según niveles homologables a los cursos a vacunar.
- 4 No fueron vacunados en su centro educacional, podrán acudir a un **vacunatorio público o privado en convenio** con la SEREMI durante todo el año.



ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ESCOLAR

1

La meta esperada es alcanzar un **90%** de cobertura de la población objetivo para cada vacuna.

2

Para evaluar la cobertura de vacunación escolar se utiliza como **numerador la información extraída del Registro Nacional de Inmunizaciones** y como **denominador la población entregada por MINEDUC.**

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ESCOLAR

PLANIFICACIÓN VACUNACIÓN ESCOLAR

El Director del establecimiento de Salud designa al equipo de vacunación Escolar.

El Director del establecimiento de salud envía carta a los establecimientos educativos informando el inicio y desarrollo de la estrategia.

El Director del establecimiento de salud solicita al Director del establecimiento educativo, distribuir **carta informativa** a los padres y apoderados.

**Al menos 10 días
antes del inicio de la
actividad**

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ESCOLAR

PLANIFICACIÓN EQUIPO VACUNADOR

Al menos 7 días
antes del inicio de
la vacunación



Capacitar al equipo vacunador:

LTO de vacunación escolar, ESAVI-EPRO, Ordinarios y procedimientos.

Revisar el folleto de información de las vacunas a administrar:

vía de administración, contraindicaciones, reacciones adversas entre otros.

Manejo de reacciones post vacunación.

Conocer todos los **establecimientos educativos** correspondientes por territorio de cada CESFAM (lista de matriculados, características de la población objetivo, lugar de ubicación y realizar calendario de las vacunaciones).

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ESCOLAR


PROCESO DE VACUNACIÓN

Confirmar con la encargada del Establecimiento Educacional, fecha, horario y la lista de escolares que serán vacunados.

Verificar en el Establecimiento de Salud: dosis de vacunas, CIP, jeringas, agujas e insumos.

Revisar en el RNI el listado de alumnos (nombre y Rut) y verificar su estado vacunal.

El día previo a cada vacunación



ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ESCOLAR

El día previo a cada
vacunación



PROCESO DE VACUNACIÓN

El profesional coordinador debe revisar el maletín de emergencia: a medicamentos e insumos necesarios

Contactar al Servicio de Urgencia de APS y SAMU para coordinar el apoyo en caso de emergencia médica durante la jornada de vacunación.

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ESCOLAR

EJECUCIÓN DE LA VACUNACIÓN

Preparar material e insumos a utilizar en la vacunación:

jeringa, aguja, tóriculas de algodón, riñones, cajas de eliminación.

Disponer de maletín de emergencia, verificando que cuente con todos los medicamentos e insumos necesarios

Disponer de los listados de alumnos de cada curso (revisadas en RNI previamente)

Disponer de notebook y conexión a internet para realizar registros.

El día de la vacunación



ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ESCOLAR

El día de la
vacunación




EJECUCIÓN DE LA VACUNACIÓN

Disponer de una sala donde se realizará el procedimiento de vacunación.

Solicitar la colaboración de profesores y asistentes de la educación para apoyo durante el proceso de vacunación.

Solicitar una dependencia con las condiciones necesarias para el **manejo de eventuales emergencias.**

VACUNA dTpa

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Vacuna	Vacuna dTp acelular (dTpa), protege contra Difteria, Tétanos y Coqueluche
Nombre comercial	Boostrix®
Laboratorio	Glaxo Smith Kline (GSK)
Indicación	Escolares y adolescentes de 1° y 8° año básico
Presentación	Envase primario: 
	Envase secundario: 
Vía de administración	Intramuscular


VACUNA dTpa

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Contraindicaciones	No debe administrarse a individuos con hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna.
Reacciones	• Muy frecuentes: dolor de cabeza, reacciones en el lugar de inyección (dolor, enrojecimiento e inflamación), fatiga, malestar general. • Frecuentes: mareos, náuseas, trastornos gastrointestinales, fiebre $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, reacciones en el lugar de inyección (induración y absceso estéril en el lugar de la inyección)
Apariencia física	Es una suspensión inyectable blanca turbia. Cuando se almacena puede observarse un depósito blanco y un sobrenadante transparente
Almacenamiento	• Almacenar entre 2°C y 8°C • Conservar la jeringa en el envase secundario exterior para protegerla de la luz • No congelar

VACUNA VPH NONAVALENTE

GES | 20
años

INFORMACIÓN TÉCNICA


Vacuna	Vacuna VPH Nonavalente: protege contra infecciones causadas por el Virus de Papiloma Humano por los serotipos 6,11,16,18,31,33,45,52 y 58.
Nombre comercial	Gardasil 9®
Laboratorio	Merck Sharp & Dohme (MSD)
Indicación	Uso a partir de los 9 años de edad. Desde el año 2024 se incorpora a la vacunación escolar la vacuna VPH Nonavalente para todos los/as escolares que cursan 4° año básico.
Presentación	Envase primario: 
	Envase secundario: 
Vía de administración	La vacuna se administra mediante inyección intramuscular (IM) en zona deltoidea.

VACUNA VPH NONAVALENTE

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Contraindicaciones	Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna
Reacciones	• Locales: dolor, inflamación, eritema, prurito, equimosis. • Sistémicos: fiebre, fatiga, cefalea, náuseas y mareos
Apariencia física	Antes de agitar, es un líquido transparente Después de agitar, es un líquido blanco opaco.
Almacenamiento	• Almacenar entre 2°C y 8°C. • Conservar la jeringa en el envase secundario para protegerla de la luz. • No congelar.

TÉCNICA DE PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

VACUNA VPH y dTpa	
Via de administración	Intramuscular
Ángulo	90° grados
Aguja	23G x 1" o 25G x 1"
Preparación de la vacuna	Si la vacuna viene en presentación de jeringa prellenada, se debe conectar la aguja, ya que generalmente viene en forma separada.
Sitio de punción	Cara externa del deltoides, a 3 traveses de dedo por debajo del acromion.
Técnica	• Descubrir la zona de punción, en su totalidad. • Definir zona de punción. • Sujetar la zona de inyección con el dedo índice y pulgar. • Puncionar con un ángulo de 90º con un movimiento rápido y seguro. • Administrar la solución de manera rápida y sin aspirar • Realizar presión con algodón seco, en el sitio de punción • Eliminar el material utilizado (jeringa y aguja), en contenedor de residuos especiales, según REAS vigente. • Observar al usuario al menos por 30 minutos.



**LAS VACUNAS DEBEN SER
PREPARADAS EN EL
ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL, PREVIO A SU
ADMINISTRACIÓN**

REGISTRO NACIONAL DE INMUNIZACIONES

REGISTRO DE DOSIS SEGÚN VACUNA

VACUNA	DOSIS	DESCRIPCIÓN
dTpa	Única	Dosis Única, en cualquiera de los cursos (1º y 8º) que se encuentre el estudiante.
VPH noavalente	Única	Dosis Única, en estudiantes de 4to año básico.

Fuente: Elaboración propia, PNI- MINSAL 2025

REGISTRO DE CRITERIO DE ELEGIBILIDAD SEGÚN LUGAR DE ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA

VACUNA	CRITERIO DE ELEGIBILIDAD	LUGAR DE ADMINISTRACIÓN
dTpa	1º básico (Est. educacional)	En el establecimiento educacional.
	8º básico (Est. educacional)	
	1º básico (Est. de salud)	En el establecimiento de salud, público o privado en convenio.
	8º básico (Est. de salud)	
VPH	4º básico (Est. educacional)	En el establecimiento educacional.
	4º básico (Est. de salud)	En el vacunatorio público o privado en convenio.

Fuente: Elaboración propia, PNI- MINSAL 2025

- Del mismo modo corresponde:
 - » Registrar Lote correspondiente a la vacuna administrada.
 - » Registrar la próxima fecha de vacunación, si corresponde.
 - » Completados todos los campos anteriores guardar el registro ingresado.

El sistema permite el dato de **"Vacuna no administrada"** por las siguientes causas:

- Solicitud del paciente (Rechazo).
- Contraindicación.
- Otros.

Muchas gracias



GES | **20**
años
GARANTÍAS EXPLÍCITAS
EN SALUD